

Les traitements de 12 à 16 ans

A l'adolescence, selon la correction à effectuer, différentes solutions peuvent être proposées au jeune patient : l'appareil amovible, le traitement par multi-bagues ou encore une solution à l'aide de gouttières.

Traitements en denture définitive

- Entre 12 et 16 ans, toutes les dents définitives sont en place. Les traitements vont surtout consister à corriger un mauvais alignement dentaire, à l'aide de bagues si le patient ne présente pas de décalage des mâchoires, ou si une première étape avec un appareil amovible a déjà été mise en œuvre.
- Mais vers l'âge de 12-13 ans, si le praticien décèle chez l'enfant un potentiel de croissance possible, il peut être encore envisageable de corriger un décalage de mâchoires à l'aide d'appareils amovible ou fixe.



— “ L'adolescence est un très bon moment pour commencer un traitement orthodontique ! ”

› LES DIFFÉRENTS TYPES D'APPAREILS

- Pour des corrections très simples de l'alignement, on utilise des appareils amovibles. Cela peut être envisagé si le déplacement ne concerne que deux ou trois dents au maximum.
- Les traitements multi-bagues sont les plus courants à cet âge. Des attaches, brackets ou bagues sont collés sur chaque dent. Dans les brackets, un fil semi-rigide est inséré. Il est fixé par une ligature en plastique, en métal ou par un mini-clip pour les brackets auto-ligaturants. Cela permet de guider le déplacement des dents. Ces bagues (transparentes ou métalliques) sont collées sur la face extérieure des dents ou sur la face interne en orthodontie linguale.
- Les gouttières proposent un résultat similaire à celui des bagues. Le déplacement est réalisé grâce à une série de gouttières en plastique transparent qui sont changées toutes les 1, 2 ou 3 semaines. Elles sont à porter 20h/24h (repas, brossage).

— “ Certains traitements ne peuvent être effectués qu'après la sortie de toutes les dents définitives. ”



Selon la correction à effectuer, il est proposé un appareil amovible ou un traitement par multi-bagues.



L'évolution des techniques orthodontiques et des matériaux permet de proposer, selon le cas, des appareils discrets, confortables et n'occasionnant pas de défaut d'élocution.

› CAS COMPLEXES

- L'absence de dents définitives (agénésie) peut également être traitée. Dans la majorité des cas il s'agit d'agénésie des incisives latérales, remplacées par des canines. Les dents présentes sont alors déplacées à l'aide de gouttières ou d'un appareillage fixe afin de fermer les espaces correspondant aux dents absentes. Dans certains cas, les dents absentes sont remplacées par des implants.
- Les dents incluses, c'est-à-dire qui sont restées bloquées à l'intérieur de la mâchoire par manque de place, mauvaise orientation ou par présence de dents de lait ayant entravé

l'éruption d'une dent définitive... peuvent également nécessiter une prise en charge orthodontique.

— “ De nombreuses possibilités de traitement, même dans les cas les plus complexes, permettent de répondre efficacement aux problèmes de votre adolescent. ”

À savoir

A une période particulièrement sensible de leur vie, les adolescents redoutent le plus souvent de porter des bagues. Avec les nouvelles techniques, ils peuvent désormais bénéficier d'appareillages très discrets.

Dans certains cas particuliers, des interventions chirurgicales pourront être envisagées. Ces techniques permettent d'intervenir directement sur le positionnement de l'os et de la mâchoire.